Fiche commerciale

Date de mise à jour : 21/08/2015

NYNA D+ PATE AMM PROFESSIONNELLE

1 - COMPOSITION
Matière active : Difénacoum
Taux de matière active : 0.005 %
Support : pâtes fraiches

2 - AGREMENT, AUTORISATION DE VENTE : A.M.M : FR-2012-0003

3 - MODE D'ACTION : Par ingestion répétée ; Anticoagulant

4 - RECOMMANDATIONS

Le produit ne peut être utilisé que dans des postes d'appâtage sécurisés, ils permettent de protéger l'appât des agents extérieurs (poussière...), d'éviter l'ingestion par des espèces non cibles et la dispersion dans l'environnement. Les postes doivent être placés de manière sûre pour minimiser les risques d'accès au produit et d'ingestion par des enfants ou des animaux non cibles. S'assurer que les boîtes sont correctement fermées pour éviter que les appâts ne soient sortis des postes par les rongeurs. Ne pas traiter les surfaces et les ustensiles qui pourraient être en contact avec des aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale. Ne pas rejeter le produit dans l'environnement ou les canalisations. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. Collecter les appâts non consommés, les débris entraînés hors des boîtes et stations d'appât et les rongeurs morts. Déposer les postes d'appâtage usagés et les appâts non consommés en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié. L'emballage ne doit pas être réutilisé ni recyclé. Les boîtes à appât ne doivent pas être utilisées pour contenir d'autres produits que les rodonticides. Consulter la FDS.

5 - MODE D'EMPLOI

Porter des gants appropriés, ne pas toucher les appâts directement avec les doigts, ne pas ouvrir les sachets. Déposer dans des postes d'appâtage : 180g de produit espacé de 5 à 10 mètres pour des rats, 30g de produit espacé de 1 à 2 mètres pour des souris. Les postes doivent
être placés le long des chemins empruntés par les rongeurs et dans les endroits les plus fréquentés. Contrôler les postes une fois par semaine, les compléter si nécessaire, ne pas nettoyer les postes entre deux applications. Les symptômes apparaissent 36 h après l'ingestion et les rongeurs meurent en 4 à 10 jours. Retirer tous les postes après la fin du traitement.
Alterner les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents afin d'éviter l'apparition de phénomènes de résistance.
Adopter des méthodes de gestion intégrée telles que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et mesures d'hygiène. Vérifier l'efficacité du produit sur site : le cas échéant, les causes de diminution d'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de
résistance. Ne pas utiliser les produits dans des zones où les cas de résistance sont suspectés ou établis. Prévenir le responsable de la mise sur le marché en cas de non efficacité du traitement.

6 - ANTIDOTE : Vitamine K1

7 - CONDITIONNEMENT : S/44 - Seau de 5 Kg

SOFAR France - ZA du Drevers - BP2 - 29190 Pleyben
Tél. 02 98 26 61 81 - Fax 02 98 26 67 88 - www.raticides.com - sofar.france@wanadoo.fr
Siret 388 865 636 00012 – APE 2013B